

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA DEKONTAMINACJI AMBULANSU PO REALIZACJI ZLECENIA WYJAZDU DO OSÓB ZAKAŻONYCH LUB POTENCJALNIE ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2



Dotyczy: zespołów ratownictwa medycznego i transportu, realizujących zlecenie na terenie miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego oraz transportujących pacjentów do szpitala w Ostrołęce.

Po zakończeniu realizacji zlecenia zespół niezwłocznie i bezpośrednio udaje się na dekontaminację ambulansu do Stacji Transportu i Obsługi Pojazdów „MEDITRANS OSTROŁĘKA” przy ul. Rolnej 28 w Ostrołęce. Docelowe miejsce znajduje się w dawnym budynku przechowalni butli z tlenem medycznym, za budynkiem diagnostyki pojazdów. Przed wykonaniem dekontaminacji ambulansu członkowie zespołów mają zakaz kontaktowania się w sposób bezpośredni ze wszystkimi osobami.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

DEZYNFEKCJA WSTĘPNA

1. Po przybyciu do wyznaczonego miejsca należy ambulansem wjechać pod wiatę.
2. Wszystkie czynności związane z odkażaniem i dekontaminacją ambulansu powinny być wykonywane przy użyciu środków ochrony osobistej.
3. Dekontaminację przeprowadzoną na przewidzianym do tego stanowisku należy rozpocząć od usunięcia z ambulansu wszystkich jednorazowych materiałów, z którymi miała styczność osoba chora. Materiały te powinny być traktowane jako odpad medyczny.
4. Podczas dekontaminacji ambulansu istotna jest gruntowna dezynfekcja wszystkich powierzchni wewnętrznych i elementów wyposażenia, także tych, których mogły dotyczyć osoby z załogi ambulansu, włączając w to nosze do transportu chorego, klamki, przyciski, uchwyty, klucze. Należy uwzględnić także analogiczne elementy znajdujące się na zewnątrz ambulansu (klamki).


5. Do dezynfekcji powierzchni w ambulansie należy stosować środki dezynfekcyjne do tego przeznaczone, które znajdują się na wyposażeniu karetki.

DEZYNFEKCJA CHEMICZNA

1. Do chemicznej dezynfekcji ambulansu należy użyć urządzenia NOCOSPRAY, zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu.
2. Po umieszczeniu urządzenia wewnątrz ambulansu, ustawieniu odpowiednich parametrów i włączeniu, należy jak najszybciej opuścić ambulans, zamykając okna i drzwi.
3. Po wykonaniu tych czynności członkowie zespołu zdejmują środki ochrony biologicznej. Środki wielokrotnego użytku należy obficie spryskać preparatem przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni stałych, i pozostawić do wyschnięcia.
4. Po zakończeniu cyklu dezynfekcji należy skutecznie przewietrzyć ambulans otwierając okna i drzwi na okres około 15-30 min.

Po zakończeniu dekontaminacji należy:

1. Środki jednorazowego użytku należy umieścić w czerwonych workach, a następnie w czerwonych plastikowych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniu.
2. Dokładnie zdezynfekować ręce preparatem do tego przeznaczonym.
3. Odnotować wykonanie czynności w zeszycie kontrolnym znajdującym się w pomieszczeniu.
4. Zamknąć pomieszczenia na klucz, po czym udać się do miejsca wyczekiwania.

Pielęgniarz
Koordynujący i Nadzorujący

Michał Dumala

Pielęgniarz Koordynujący
i Nadzorujący


Tomasz Dmochowski

Opracował:

Tomasz Dmochowski
Michał Dumala


Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
lek. Mariusz Zorczykowski

Zatwierdził:

Mariusz Zorczykowski - Zastępca Dyrektora Ds. Medycznych