



Ministerstwo Zdrowia

Sekretarz Stanu

Waldemar Kraska

Warszawa, 11 lutego 2020 r.

ROR.520.1.13.2020.MS

Wojewodowie
wszyscy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma znak j. w. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zaleceń dla zespołów transportu sanitarnego/medycznego oraz zespołów ratownictwa medycznego, w związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, ponawiam prośbę o ich przekazanie do podmiotów leczniczych i stosowanie. W załączeniu przekazuję przedmiotowe zalecenia do stosownego wykorzystania.

Jednocześnie proszę o zobowiązanie szpitali do opracowania ścieżki przyjęcia pacjenta podejrzanego o zakażenie koronawirusem, który zgłosił się do szpitala samodzielnie, w celu zminimalizowania jego kontaktu z innymi osobami.

Z poważaniem,

Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

- 1) Główny Inspektor Sanitarny
- 2) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zalecenia dla zespołów transportu sanitarnego/medycznego oraz dla zespołów ratownictwa medycznego, w związku z ryzykiem wystąpienia zakażeniem koronawirusem z Wuhan nCoV2019

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, obowiązują więc zasady izolacji oddechowej. Używany powinien być sprzęt jednorazowy, a tam, gdzie to niemożliwe, sprzęt powinien być dedykowany pacjentowi, a następnie poddany dekontaminacji. Konieczne jest rutynowe sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, z którymi pacjent miał kontakt. Osoba podejrzana o zakażenie powinna mieć ograniczony kontakt z innymi osobami, w tym z rodziną.

1. Środki ochrony dla personelu:

- obowiązują ubrania jednorazowe z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przyłbice chroniące oczy, higiena rąk zwłaszcza w kontakcie wydzielinami i wydaliniami pacjenta;

- maseczka twarzowa - powinna być przynajmniej chirurgiczna lub mieć filtr FFP2 albo FFP3, N 95 i dobrze przylegać do twarzy; nie dopuszcza się maseczek papierowych ani fizelinowych.

2. Środki ochrony dla pacjenta – powinna być zastosowana maseczka ochronna, zwłaszcza, jeśli pacjent kicha lub kaszle. Nie jest konieczny transport pacjenta w izolatorze.

3. Pacjent podejrzany o zakażenie koronawirusem 2019-nCoV powinien być przetransportowany bezpośrednio do szpitala zakaźnego albo do szpitala dysponującego oddziałem chorób zakaźnych. Każdorazowo personel transportujący pacjenta lub główny dyspozytor medyczny, w sytuacji gdy pacjent transportowany jest przez zespół ratownictwa medycznego, powinien poinformować szpital o takim transporcie i uzgodnić ścieżkę przekazania pacjenta w taki sposób, aby odbyło się ono bez narażenia na zakażenie innych osób.

4. Po zrealizowaniu wyjazdu i przekazaniu pacjenta konieczna jest dezynfekcja ambulansu środkami przeciwwirusowymi.